

# PATIENTENERINNERUNGSKARTE

Name des Arztes: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## **TOCTINO darf nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden.**

TOCTINO kann bei einem ungeborenen Baby schwere Schäden verursachen, wenn es von einer schwangeren Frau eingenommen wird.

**Wenn Sie schwanger geworden sind oder glauben, schwanger geworden zu sein, stoppen Sie sofort die Einnahme von TOCTINO und kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt.**

Lesen Sie genau die Packungsbeilage, bevor Sie die Behandlung mit TOCTINO beginnen.

**Sollten Sie Fragen oder Bedenken zur Einnahme von TOCTINO haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.**

PM-AT-ALT-PINF-220001/ 01/2022



# PATIENTENERINNERUNGSKARTE

Name des Arztes: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## **TOCTINO darf nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden.**

TOCTINO kann bei einem ungeborenen Baby schwere Schäden verursachen, wenn es von einer schwangeren Frau eingenommen wird.

**Wenn Sie schwanger geworden sind oder glauben, schwanger geworden zu sein, stoppen Sie sofort die Einnahme von TOCTINO und kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt.**

Lesen Sie genau die Packungsbeilage, bevor Sie die Behandlung mit TOCTINO beginnen.

**Sollten Sie Fragen oder Bedenken zur Einnahme von TOCTINO haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.**

PM-AT-ALT-PINF-220001/ 01/2022



# PATIENTENERINNERUNGSKARTE

Name des Arztes: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## **TOCTINO darf nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden.**

TOCTINO kann bei einem ungeborenen Baby schwere Schäden verursachen, wenn es von einer schwangeren Frau eingenommen wird.

**Wenn Sie schwanger geworden sind oder glauben, schwanger geworden zu sein, stoppen Sie sofort die Einnahme von TOCTINO und kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt.**

Lesen Sie genau die Packungsbeilage, bevor Sie die Behandlung mit TOCTINO beginnen.

**Sollten Sie Fragen oder Bedenken zur Einnahme von TOCTINO haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.**

PM-AT-ALT-PINF-220001/ 01/2022

### **Was sollten Sie tun, wenn Sie schwanger werden könnten:**

- **Sie müssen mindestens 1 hochwirksame Verhütungsmethode (z.B. eine intrauterine Applikation) oder 2 wirksame, korrekt angewendete und ergänzende Verhütungsmethoden (z.B. eine orale Kontrazeption mit einem Kondom) vor, während und bis 1 Monat nach der Behandlung anwenden.**
- **Sie dürfen keinesfalls schwanger werden**, wenn Sie TOCTINO einnehmen und bis 1 Monat nach Behandlungsende.
- **Sie müssen zu regelmäßigen Kontrollen kommen und sich regelmäßigen Schwangerschaftstests unterziehen:**
  - Vor Behandlungsbeginn müssen Sie einen negativen Schwangerschaftstest vorlegen.
  - Um sicher zu gehen, dass Sie nicht während der Behandlung schwanger sind, müssen Sie regelmäßig Schwangerschaftstests durchführen, idealerweise jeden Monat. Auch sollten Sie einen abschließenden Schwangerschaftstest 1 Monat nach Behandlungsende durchführen.

### **Erinnerung für Männer und Frauen:**

Dieses Medikament wurde nur Ihnen verschrieben. **Geben Sie es nicht an andere Personen weiter. Bringen Sie nicht verwendete Kapseln zurück in Ihre Apotheke.**

### **Was sollten Sie tun, wenn Sie schwanger werden könnten:**

- **Sie müssen mindestens 1 hochwirksame Verhütungsmethode (z.B. eine intrauterine Applikation) oder 2 wirksame, korrekt angewendete und ergänzende Verhütungsmethoden (z.B. eine orale Kontrazeption mit einem Kondom) vor, während und bis 1 Monat nach der Behandlung anwenden.**
- **Sie dürfen keinesfalls schwanger werden**, wenn Sie TOCTINO einnehmen und bis 1 Monat nach Behandlungsende.
- **Sie müssen zu regelmäßigen Kontrollen kommen und sich regelmäßigen Schwangerschaftstests unterziehen:**
  - Vor Behandlungsbeginn müssen Sie einen negativen Schwangerschaftstest vorlegen.
  - Um sicher zu gehen, dass Sie nicht während der Behandlung schwanger sind, müssen Sie regelmäßig Schwangerschaftstests durchführen, idealerweise jeden Monat. Auch sollten Sie einen abschließenden Schwangerschaftstest 1 Monat nach Behandlungsende durchführen.

### **Erinnerung für Männer und Frauen:**

Dieses Medikament wurde nur Ihnen verschrieben. **Geben Sie es nicht an andere Personen weiter. Bringen Sie nicht verwendete Kapseln zurück in Ihre Apotheke.**

### **Was sollten Sie tun, wenn Sie schwanger werden könnten:**

- **Sie müssen mindestens 1 hochwirksame Verhütungsmethode (z.B. eine intrauterine Applikation) oder 2 wirksame, korrekt angewendete und ergänzende Verhütungsmethoden (z.B. eine orale Kontrazeption mit einem Kondom) vor, während und bis 1 Monat nach der Behandlung anwenden.**
- **Sie dürfen keinesfalls schwanger werden**, wenn Sie TOCTINO einnehmen und bis 1 Monat nach Behandlungsende.
- **Sie müssen zu regelmäßigen Kontrollen kommen und sich regelmäßigen Schwangerschaftstests unterziehen:**
  - Vor Behandlungsbeginn müssen Sie einen negativen Schwangerschaftstest vorlegen.
  - Um sicher zu gehen, dass Sie nicht während der Behandlung schwanger sind, müssen Sie regelmäßig Schwangerschaftstests durchführen, idealerweise jeden Monat. Auch sollten Sie einen abschließenden Schwangerschaftstest 1 Monat nach Behandlungsende durchführen.

### **Erinnerung für Männer und Frauen:**

Dieses Medikament wurde nur Ihnen verschrieben. **Geben Sie es nicht an andere Personen weiter. Bringen Sie nicht verwendete Kapseln zurück in Ihre Apotheke.**